



Pinus pinaster



Výška	25 - 40 m
Šírka	10-15m
Koruna	round to fan-shaped, dark, dense crown, capricious growing
Kôra a vetvy	twigs reddish brown, bark brown-red and deeply grooved
Listy	stiff needles, in twos, 10 - 20 cm, glossy green, evergreen
Kvety	? in clusters by the young shoots, yellow, fragrant flowers
Plody	cones, single or in clusters of up to four, 10 - 20 cm long, 5 - 8 cm wide
Trne	Žiadny
Jedovatosť	Zvyčajne nie je jedovaté pre ľudí a väčšie zvieratá
Pôdna vlhkosť	Vhodné do suchých pôd
Spevnené plochy	Netoleruje spevnené plochy
Zóna odolnosti	8a (-12,2 do -9,5 °C)
Odolnosť voči vetru	very good
Ostatná odolnosť	Odolné vetru
Stromy pre zvieratá a hmyz	Odolné vetru, Plody ako potrava pre vtáctvo
Použitie	pobrežné zóny, priemyselné oblasti
Tvar	Vysokokmeň, Viackmeň, Vzorový ihličnan
Pôvod	South-West and Southern Europe, North-West Africa
Synonymum	Pinus maritima

Velký strom, který ve svém původním areálu, hlavně v pobřežních oblastech, roste na suchých, písčitých půdách s výjimkou Maroka, kde se strom vyskytuje až do výšky 2000 m v horách. V průběhu staletí byl hojně využíván ke zpevňování dun a k výrobě terpentýnu. V důsledku toho se strom vyskytuje ve volné přírodě i jinde, včetně Jižní Afriky. Pinus pinaster vytváří kulovitou až později vějířovitou korunu. Dospělá kůra je červenohnědá s tmavšími hlubokými rýhami. Tuhé jehlice jsou poměrně dlouhé a leskle zelené. Na všech stranách mají stomatální pruhy. Štíhlé šišky jsou zpočátku purpurově hnědé a při dozrávání světle hnědé. Pro svou citlivost na mraz je tato borovice nevhodná pro velkoplošné použití v severozápadní Evropě, je však vhodná na terasy a do velkých atrií. Velmi dobře snáší mořský vítr a není citlivá na znečištění ovzduší.